

TESTEO DE SUSTANCIAS

ESPECTRÓMETRO FTIR + TIRAS REACTIVAS DE FENTANILO

Es posible que las drogas no sean lo que usted piensa.

Aún si conoce el origen, es posible que la droga contenga sustancias no previstas y peligrosas.

El testeo de sustancias puede ayudar a **reducir el riesgo** porque aporta información acerca de lo que realmente contiene una droga, para que pueda tomar **decisiones mejor informadas**.

Lo que podemos decirle sobre su testeo:

Mediante el análisis con FTIR:

- Hasta 3 o 4 componentes principales en una mezcla, y las proporciones aproximadas.
- Otras drogas y sustancias que pueden combinarse o utilizarse como relleno.

Mediante las tiras reactivas:

- Si la muestra contiene fentanilo y algunos de sus análogos.
- **Nota:** Las tiras solo comprueban el fentanilo en la muestra provista. Es posible que haya fentanilo presente en el resto de la droga. A veces, las tiras pueden indicar un resultado negativo cuando hay fentanilo o un análogo presente.

Lo que no podemos decirle sobre su testeo:

- El análisis mediante espectroscopía de infrarrojos con transformada de Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés) no puede detectar sustancias presentes en bajas cantidades (menos del 5 %).
- Cantidades específicas o el porcentaje exacto en una mezcla.
- Sustancias nuevas o extrañas que no figuran en nuestra base de datos de referencia.
- No podemos distinguir fehacientemente entre sustancias específicas con una composición química similar (p. ej., familia 2C, análogos del fentanilo).

El testeo de sustancias no garantiza que la droga sea segura para consumo. En algunos casos, es posible que el análisis con FTIR y las tiras reactivas no detecten el fentanilo, sus análogos u otras sustancias peligrosas.

Incluso después de hacer el testeo, se recomienda lo siguiente:

- Nunca consuma las drogas solo.
- Conozca los síntomas de sobredosis y solicite asistencia médica si considera que es necesario.
- Comience con una cantidad reducida.
- Sepa cómo usar la naloxona y llévela consigo.
- Evite mezclar sustancias (especialmente alcohol con fármacos depresores), ya que esto aumenta el riesgo de sobredosis.
- Use las drogas donde haya asistencia disponible, siempre que sea posible, como un centro de prevención de sobredosis.